

我需要知道什麼是結核病菌感染嗎？

我怎會得到結核病？
我根本沒有任何病癥。

什麼是結核病(TB)?

結核病是由一種特別細菌感染而成的傳染病。這種細菌是由病患者咳嗽或噴嚏時散播在空氣中。你就從空氣中吸取細菌而得到結核病。

結核病可分為兩階段:第一階段稱為被感染期(非傳染)

- 有潛伏的結核菌在身體內
- 並未發病, 及並無任何癥狀
- 不會傳播細菌給任何人

有些人會進入第二階段:傳染性 結核病。病患者會:

- 有很多傳染性細菌在體內
- 你已發病及有癥狀如咳嗽,發燒及體重減輕等
- 可以傳染細菌給別人

有些人或者會有一些藥物反應. 如果你感覺到有一個或更多以下癥兆, 切勿繼續服藥,應立即致電給診所, 電話號碼 415-206-8524.

- 連續性食慾下降
- 作悶
- 作嘔
- 小便呈深顏色(咖啡色或茶色)
- 眼睛變黃
- 皮膚變黃
- 出疹
- 痕癢
- 發高燒
- 眼花
- 四肢抽筋或麻痺
- 其它不尋常的癥兆

喝酒及服食 INH 藥丸?

INH 藥丸主要是通過肝部來運行. 喝酒會對肝部有所負擔. 在服藥期間最好就是切勿喝酒. 在你服 INH 藥丸期間, 可能會檢查你的肝臟以肯定你食藥安全.

- Isoniazid (INH) _____
- Pyridoxine (Vitamin B6) _____
- Rifampin _____
- Rifamate (INH and Rifampin) _____
- _____

假如你有一日忘記食藥切勿在隔日後服雙倍份量藥丸. 只可以食指定的份量.


你的醫生可能根據你的病情而更改藥物.

診所地址:

Tuberculosis Clinic, Ward 94
SFGH Building 90, 4th Floor
2460 22nd Street at Potrero Avenue
San Francisco, CA 94110
Main phone number 415-206-8524
Fax: 415-206-4565

我怎樣知道是否已被結核細菌感染？

只有你的醫生能告訴你是否已患有結核病。首先你須接受舊式的皮下測試或新採用的驗血方法作檢查。呈陽性反應則表示已經有細菌潛伏體內(感染期),你須要照肺X光片以確定體內細菌有否破壞你的肺部而形成結核病。在醫生診斷你是否有傳染性結核病期間,你可能須要取痰樣本化驗是否有細菌存在。



你並非傳染者

所有被感染結核細菌者,並不可能散播細菌給別人。



結核病是可以預防的

如果已被細菌感染的話,你的風險得到結核病會較高。有可能即時發病或多年後發病。你可以服用藥丸名為**ISONIAZID (INH)**來預防結核病。此藥丸容易服用。而且安全及可殺菌。你的醫生或會開其它相似的藥物給你服用。

我需要怎樣做才能預防結核病？

最重要的就是準時食藥,遵照醫生吩咐,服食所有藥丸。



- 準時見你的醫生或護士
- 通知診所假如你不能守約或外出旅遊
- 通知醫生假如你懷孕,服用其它藥物或有其它疾病
- 每日都準時服藥,養成習慣
- 每月準時回到你的醫生或護士處配藥
- 切勿將藥物交給別人
- 切勿酗酒